

LSD, Codeín, Ketamin y Fentanilo Parches disponibles

Envia un email al anunciante: euphoriapharms@gmail.com

Messenger: Contacto :

Fecha: Mircoles, 03 Noviembre de 2021

185 personas han visto este anuncio

Precio: 0

Somos proveedores profesionales de los siguientes productos para uso privado únicamente. Efedrin, Pseudoefedrin, Mdma, Metanfetamin, Heroín, Anfetamin, Burundaga, Nembuta l en polvo y líquido, Ketamin, Parches de fentanil, Codein Sirop, LSD, Adderall, Pregabalin, Éxtasis (molly), Adipex, Lorazepam, Suboxone, Rohipnol 2mg, Alprazolam, Tramadol, Dextroanfetamin 15 mg, Ritalin (Rubifen), Rivotril 2mg, Zopiclon, ​​vicodin, Oxycontin, Morfin, eutilon. No se requiere receta médica para realizar una compra con nosotros. ¡CONTÁCTENOS para realizar sus pedidos ahora !: => Correo electrónico: euphoriapharms@gmail.com => Telegram: @euphoriapham El paquete está bien sellado y llega a su destino en 24 horas. después de realizar sus pedidos, nuestras entregas son 100% seguras, rápidas, seguras y discretas con indetectable embalaje y entrega. Realizamos entregas discretas y seguras en otras ciudades. Contáctenos para realizar sus pedidos. NOTA: ¡Solo compradores serios! Los compradores deben ser específicos con sus demandas y estar listo para trabajar en nuestros términos.





MOC 27808-065-02

Promethazine Hydrochloride and Codeine Phosphate Oral Solution

6.25 mg and 10 mg per 5 mL

Alcohol 8% (v/v)

WARNING: Contains sodium metabisulfite, a sulfite that may cause allergic-type reactions.

IMPORTANT: Dispense the accompanying Medicated Grits to each patient.

Rx only

16 fl. oz. (473 mL)

Tris
Pharma

IN THE EVENT OF A SUDDEN ONSET OF ALLERGIc REACTIOnS, SUCH AS SWELLING OF THE FACE, THROAT, OR TONGUE, OR DIFFICULTY BREATHING, STOP TAKING THIS PRODUCT IMMEDIATELY AND CONTACT YOUR HEALTHCARE PROVIDER FOR FURTHER INSTRUCTIONS.

Excipient: Contains Sodium Metabisulfite.

Warnings: Contains sodium metabisulfite, a sulfite that may cause allergic-type reactions (including asthma and, in severe cases, anaphylaxis). It may also cause other allergic reactions.

Directions: See accompanying Medication Guide for full prescribing information.

Caution: May impair judgment and motor skills. Avoid driving or operating machinery until you know how this medicine affects you. Do not drink alcohol while taking this medicine.

Keep this and all other medicines out of the reach of children, especially young children. This medicine contains a strong bitter taste.

Store at 20° to 25° (68° to 77° F); excursions permitted to 15° to 30° (59° to 86° F) [see USP Controlled Room Temperature].

Protect from light. Dispense in light-resistant container (30) which meets requirements.

Manufactured by Tris Pharma, Inc., Marshall, MA 01450. www.trispharma.com. 1-800-441-7100.

